

все в 80 31.07.2012



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

АКОгрипдилум (АСOgripdilum)

Комплексное гомеопатическое лекарственное средство

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР:

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

АСOgripdilum/АКОгрипдилум

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Капли для приема внутрь, 20 мл.

ОПИСАНИЕ

Раствор желтоватого цвета специфического запаха и острого вкуса.

СОСТАВ

В 1 г раствора содержится:

Переступень белый D4 0,01 г

Красавка D4 0,01 г

Эвкалипт шаровидный D3 0,01 г

Бузина черная D3 0,01 г

Прострел луговой D4 0,01 г

Готовое лекарственное средство содержит не менее 37 % этанола.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Гомеопатическое лекарственное средство.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакодинамика

Гомеопатическое средство АКОгрипдилум не вызывает фармакологических эффектов, а действует особым гомеопатическим образом.

Его эффекты не зависят от концентрации специфических компонентов или ингредиентов.


По этой причине оказывается невозможным детерминировать доза-зависимые фармакологические эффекты, фармакологическое поведение и фармакологические свойства.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике гомеопатического лекарственного средства не предоставляются на основании того, что:

А) все компоненты гомеопатического комплекса более 10 лет занесены в государственную фармакопею;

Б) механизм действия всех компонентов гомеопатического лекарственного средства АСОgripdilum/АКОгрипдилум научно изучен.



Поэтому, гомеопатическое лекарственное средство рекомендуется к применению (см. область применения)

Доклинические данные о безопасности применения лекарственного средства
Данные о гомеопатическом лекарственном средстве не предоставляются.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических показаний.

Традиционно применяется при недомоганиях, связанных с простудой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам гомеопатического лекарственного средства. Средство не должно применяться пациентами с алкогольной зависимостью.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Средство применять согласно с требованиями инструкции.

Перед началом применения лекарственного средства АКОгрипдилум необходимо установить, не вызваны ли вышеуказанные симптомы первичной болезнью, которую необходимо лечить специфическими средствами.

В первые несколько дней приема гомеопатического средства возможно обострение симптомов. Это говорит о том, что организм реагирует на прием гомеопатического средства.

Если применение лекарственного средства не улучшает состояния пациента, то необходимо обратиться к врачу для коррекции лечения.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

В течение применения АСОгрипдилум/АКОгрипдилум обострения симптомов заболеваний не было выявлено.

Если применение лекарственного средства не улучшает состояния пациента, то необходимо обратиться к врачу для коррекции лечения.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ

Не выявлено побочных реакций у применяющих средство беременных женщин и кормящих матерей.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Не выявлено.


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Возможно сочетание с другими лекарственными средствами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Детям от 6 до 12 лет по 6 капель каждые два часа в первый день болезни, в последующие дни по 6 капель 3 раза в день.

Подросткам от 12 до 16 лет по 8 капель каждые два часа в первый день болезни, в последующие дни по 8 капель 3 раза в день.



Взрослым по 15 капель каждые два часа в первый день болезни, в последующие дни по 15 капель 3 раза в день.

Людам старше 60 лет по 10 капель каждые два часа в первый день болезни, в последующие дни по 10 капель 3 раза в день.

Принимать до выздоровления.

Раствор принимать за 0,5-1 час перед едой, накапывая капли в чайную ложку воды или на кусочек сахара для рассасывания во рту.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Не выявлено.

УПАКОВКА

Первичная упаковка: капли гомеопатические по 20 мл во флаконах темного стекла с навинчивающейся крышкой из пропилена, с капельницей из полиэтилена.

Вторичная упаковка: каждый флакон помещают вместе с инструкцией по применению в картонную упаковку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном и незаметном для детей месте.

Хранить в упаковке производителя для защиты от света.

Хранить в защищенном от сильных электромагнитных полей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года.

Не принимать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕКИ

Без рецепта.

ПРОИЗВЕДЕНО

ЗАО «Аконитум», Литовская Республика

УПАКОВАНО

Государственным предприятием «АКАДЕМФАРМ», Республика Беларусь по заказу СООО «АконитФарма», Республика Беларусь

Претензии от потребителей принимаются по адресу: 220141 г.Минск, ул.академика В.Ф.Купревича, д.5, корп.3, Республика Беларусь