

16.12.2016г
P


**Листок-вкладыш для пациента
для лекарственного средства
АКОседум**

Гомеопатическое лекарственное средство. Перед применением проконсультируйтесь с врачом, специализирующимся на гомеопатическом методе лечения.

Регистрационный номер

Наименование

АКОседум



Лекарственная форма

Капли для приема внутрь

Описание

Жидкость со специфическим запахом валерианы и характерным вкусом, от желтого до коричневатого-желтого цвета. Возможно наличие небольшого осадка.

Состав

В 1 г (1,20 мл) раствора содержится:

Валериана лекарственная Ø 0,01 г,

Игнация амара СЗ 0,001 г,

Камфора СЗ 0,001 г,

Натриево-хлористое золото С6 0,001 г,

Кактус крупноцветковый D4 0,01 г.

Готовое лекарственное средство содержит не менее 25%(об/об) этанола.

В 1 мл лекарственного средства АКОседум содержится 40 капель.

Вспомогательные вещества: спирт этиловый 96%, вода очищенная.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие лекарственные средства. Гомеопатическое лекарственное средство.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

АКОседум представляет собой гомеопатическое лекарственное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.



Фармакокинетика

Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Область применения

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Применяется в комплексной терапии при неврастении.

Способ применения и дозы

Детям от 3 до 6 лет по 2 капли 3 раза в день.

Детям от 6 до 12 лет по 4 капли 3 раза в день.

Дети с 12 до 18 лет по 6 капель 3 раза в день.

Взрослым по 10 капель 3 раза в день.

Лицам пожилого возраста по 8 капель 3 раза в день.

Раствор принимать за 0,5-1 час до еды. Перед приемом гомеопатическое средство следует развести в небольшом количестве воды (1 чайная ложка).

Длительность курса лечения

Продолжительность приема гомеопатического средства определяется врачом. Если во время приема гомеопатического средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Применение у детей

Гомеопатическое средство АКОседум не применять у детей до 3 лет, перед применением у детей старше 3 лет проконсультируйтесь с врачом.


Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам средства.

Средство не должно применяться пациентами с алкогольной зависимостью.

Меры предосторожности

Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача. Перед началом приема гомеопатического средства АКОседум необходимо удостовериться в отсутствии других заболеваний, проявляющихся неврастением и расстройствами нервной системы, требующих назначения иных специфических лекарственных средств. В разовой дозе гомеопатического средства (10 капель) содержится 50 мг спирта этилового, данное средство не сле-



дует принимать пациентам с заболеваниями печени, алкогольной зависимостью, эпилепсией, черепно-мозговой травмой и другими заболеваниями головного мозга со снижением судорожного порога, беременным и кормящим грудью женщинам, детям до 3 лет. Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу. В начале лечения гомеопатическим средством возможно временное ухудшение симптомов заболевания. В случае ухудшения состояния прием гомеопатического средства следует прекратить и обратиться к врачу.

Действие гомеопатического средства может уменьшиться при курении или под влиянием других вредных привычек (например, употребление алкоголя).

Применение у детей

Гомеопатическое средство АКОседум не применять у детей до 3 лет, перед применением у детей старше 3 лет проконсультируйтесь с врачом.

Беременность и период лактации

В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта гомеопатическое средство не следует принимать во время беременности и лактации.

Побочное действие

Возможно развитие реакций гиперчувствительности (аллергических реакций), желудочно-кишечных расстройств (тошнота, боли в животе). В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Исследования по оценке взаимодействия с другими лекарственными средствами не проведены. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Информация о случаях передозировки отсутствует. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Влияние на способность управлять автотранспортом и работать с механизмами

Лекарственное средство содержит этиловый спирт. Во время приема лекарственного средства не рекомендовано вождение автомобиля и работа с движущимися механизмами.



СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Упаковка

Первичная упаковка: Капли гомеопатические по 20 мл в флаконах темного стекла с навинчивающейся крышкой из пропилена, с капельницей из полиэтилена.

Вторичная упаковка: Каждый флакон помещают вместе с инструкцией по применению в картонную упаковку.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. После вскрытия флакона лекарственное средство следует использовать в течение 6 месяцев. Не принимать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Государственное предприятие «АКАДЕМФАРМ» (Республика Беларусь) по заказу ООО «АконитФарма».

Адрес: ул. академика В.Ф. Купревича, д.5, к.3, Минск, 220141, Республика Беларусь, тел/факс 8(017) 268-63-64.

