

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ ПОТРЕБИТЕЛЮ О
ЛЕКАРСТВЕННОМ СРЕДСТВЕ
ГИНКОБИЛ
(GINKOVIL)**

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ СРЕДСТВА


Гинкобил

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ

Ginkgo folium

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Гинкобил 80 мг капсулы

**СОСТАВ**

В 1 капсуле содержится 80 мг сухого экстракта листьев Гинкго (*Ginkgo biloba*), что соответствует 17,6-21,6 мг флавоноидов в пересчете на флавоногликозиды, 2,24-2,72 мг гинкголидов А, В и С, 2,08-2,56 мг билобалидов.

Вспомогательные вещества:

- а) содержимое капсулы: микрокристаллическая целлюлоза (147,00 мг), тальк (10,00 мг), магния стеарат (4,50 мг), кремния диоксид коллоидный безводный (4,50 мг);
б) состав оболочки капсулы: желатин (76,00 мг), титана диоксид (0,380 мг), железа оксид красный (0,140 мг).

ОПИСАНИЕ

Капсулы твердые желатиновые коричневого цвета, цилиндрической формы размера «1».

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Средства, которые применяются при деменции.

КОД АТХ

N06DX02

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**Фармакодинамика**

В экспериментальных условиях установлено, что экстракт листьев Гинкго вызывает следующие фармакологические эффекты:

- увеличивает толерантность к гипоксии, особенно мозговой ткани;
- предотвращает появление отека мозга, вызванного травмой или токсинами, и способствует его исчезновению;
- уменьшает отек сетчатки и повреждение ее клеток;
- способствует компенсации при нарушениях равновесия;
- активизирует микроциркуляторную перфузию;
- улучшает реологические свойства крови;
- инактивирует токсические радикалы кислорода (флавоноиды);
- действует как антагонист PAF - активатор агрегации тромбоцитов (гинкголиды);
- нейпротекторное действие (гинкголиды А и В, билобалиды);
- улучшает память и увеличивает способность к учебе.

Клинические исследования показали, что экстракт листьев Гинкго обладает антигипоксическими

свойствами, улучшает кровоток, особенно в области микроциркуляции и реологические свойства крови.

Фармакокинетика

Человек усваивает 98 – 100 % гинкголида А, 79 – 93 % гинкголида В и не менее 70 % билобалида. Максимальная концентрация достигается через 1-2 часа, период полувыведения составляет около 4 часов (билобалид, гинкголид А) и 10 часов (гинкголид В). Данные субстанции выводятся в основном через мочу, незначительная часть выводится с калом.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Симптоматическое лечение когнитивных нарушений при различных видах деменции (дегенеративной, сосудистой, смешанной) с такими ведущими симптомами, как снижение концентрации внимания, ослабление памяти, депрессия, головокружение, шум в ушах, головная боль;
- Симптоматическое лечение перемежающейся хромоты при хроническом облитерирующем эндартериите (2-я стадия по Fontaine);
- Вспомогательное лечение при головокружении, шуме в ушах сосудистого и инвазионного происхождения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Когнитивные нарушения:

Взрослые 18 лет и старше: по 1 таблетке 2-3 раза в день.

Заболевания периферических артерий, головокружение, шум в ушах:

Взрослые 18 лет и старше: 2 раза в день по 1 таблетке утром и вечером.

Способ применения:

Таблетки не принимать лёжа. Таблетки следует проглатывать целиком, запивая некоторым количеством жидкости (предпочтительно стаканом воды).

Дети и подростки

Не рекомендуется для использования людьми младше 18 лет.

Продолжительность лечения:

Когнитивные нарушения:

Не менее 8 недель. Если после 3 месяцев не произошло улучшения симптомов, следует пересмотреть лечение.

Заболевания периферических артерий:

Не менее 6 недель.

Головокружение:

6-8 недель. Более длительный срок не имеет терапевтических преимуществ.

Звон в ушах:

Минимум 12 недель. Если после 6 месяцев улучшения не произошло, не следует ожидать его и после более длительного лечения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Средство применять согласно требованиям инструкции.

Не рекомендуется принимать средство Гинкобил:

-детям и подросткам до 18 лет, так как использование средства Гинкобил в этой возрастной группе не достаточно исследовано;

-при повышенной кровоточивости (при геморрагическом диатезе и при сопутствующем лечении антикоагулянтами, перед плановыми оперативными вмешательствами).

С осторожностью применять при эпилепсии.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Перед началом применения экстракта листьев Гинкго нужно установить, не вызваны ли

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

вышеуказанные симптомы первичной болезнью, которую необходимо лечить специфическими средствами.

Перед началом применения проконсультируйтесь с врачом.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ К ВОЖДЕНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ АВТОТРАНСПОРТОМ

Не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и обслуживать движущиеся механические устройства.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И КОРМЛЕНИИ ГРУДЬЮ

В период беременности и лактации средства принимать не рекомендуется, так как отсутствуют клинические данные у беременных и кормящих.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

На основании клинических исследований и данных наблюдений пострегистрационной безопасности, принимаемый в рекомендуемых дозах Гинкобил безопасен и хорошо переносится. Как и все препараты, обладающие активным действием, Гинкобил может вызывать у некоторых лиц более или менее выраженные расстройства пищеварения и кожные аллергические реакции, аллергический шок, головные боли, головокружения, а также усиление существующего головокружения. Гинкобил может усиливать эффект кровоточивости антикоагулянтных средств (например, фенпрокумон, варфарин, клопидогрель) и нестероидных противовоспалительных препаратов.

При появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Не рекомендуется сочетать прием Гинкобила с антикоагулянтными средствами (например, фенпрокумон, варфарин, клопидогрель) и с нестероидными противовоспалительными препаратами, так как не исключен эффект усиления действия. Не исключается влияние на эффект лекарственных средств, метаболизирующихся с участием цитохрома P450 3A4, -1A2, -2C19.

При одновременном приеме нескольких лекарственных средств проконсультируйтесь с врачом о возможности приема Гинкобил.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Данных о передозировке лекарственного средства не выявлено.

Возможно усиление побочных эффектов.

Специфический антидот при отравлении не известен. Лечение симптоматическое.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата.

Беременность.

Лактация.

Возраст до 18 лет.

Острое нарушение мозгового кровообращения.

Острый инфаркт миокарда.

УПАКОВКА

Гинкобил 80 мг капсулы в контурной ячейковой упаковке. Каждая контурная ячейковая упаковка содержит 20 капсул.

2, 3, 4 или 5 контурные ячейковые упаковки помещают в картонные пачки вместе с листком-вкладышем.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от влаги месте.
Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности 3 года.

Не принимать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

ПРОИЗВЕДЕНО

ЗАО «Aconitum», Тайкос пр.102, Каунас LT – 51195, Литовская Республика.

УПАКОВАНО

Государственным предприятием «АКАДЕМФАРМ», Республика Беларусь
по заказу СООО «АконитФарма», Республика Беларусь.

Претензии от потребителей принимаются по адресу: ул. Академика В.Ф. Купревича, д.5, к.3, г. Минск,
220141, тел./факс: +375 17 268 63 64, Республика Беларусь.